



## గ్రామీణ వ్యవసాయ వాతావరణ సేవా పథకము

భారత వాతావరణ సంస్థ

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

లాం, గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్



# వ్యవసాయ వాతావరణ బులెటిన్

వాతావరణ సూచన : 16-10-2020

చిత్తూర్(ఆంధ్రప్రదేశ్) యొక్క వాతావరణ సూచన - జారీ చేయబడింది :2020-10-16 ( తదుపరి 5 రోజులలో 8:30 IST వరకు చెల్లుతుంది)

వాతావరణ కారకం	2020-10-17	2020-10-18	2020-10-19	2020-10-20	2020-10-21
వర్షపాతం (మి.మీ.)	6.0	7.0	7.0	10.0	4.0
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C)	32.0	32.0	30.0	32.0	32.0
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C)	23.0	24.0	23.0	23.0	23.0
గాలిలో తేమ శాతం-ఉ (%)	88	89	87	85	81
గాలిలో తేమ శాతం-సా (%)	58	56	70	60	56
గాలి వేగం (కి.మీ./గంటకు)	8.4	7.6	7.9	8.7	11.6
గాలి దిశ (డిగ్రీ)	236	225	285	287	288
మబ్బు ఆవరణ (ఆక్టా)	8	8	8	8	7

### వాతావరణ సూచనలు :

రాగల అయిదు రోజులలో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉన్నది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 30-32 డిగ్రీ సెం.గాను కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 23-24 డిగ్రీ సెం.గాను నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నది.

### సాధారణ సలహా:

తేలికపాటి వర్ష సూచన ఉన్నది. వరిలో ఆకుముడుత ఆశించకుండా కార్టాప్ హైడ్రోకోర్టెడ్ 2 గ్రా./లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చెయ్యాలి.

### ఎస్.ఎం.ఎస్. సలహా:

కంది పంట విత్తి ఎక్కడైన మొగ్గ మొదలయ్యే దశలో ఉన్నట్లయితే వేప నూనె 5 మి.లీ. + 1 గ్రా. సబ్బు పొడి/లీ. నీటికి చొ.న. కలిపి పంట పై పిచికారి చేసుకోవాలి.

### పంట ప్రత్యేక సలహా:

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
-----	-------------------

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వరి	<ul style="list-style-type: none"> <li>ప్రస్తుత వాతావరణం వరిలో కాండం తొలుచు పురుగు మరియు ఆకుముడత పురుగు ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణగా క్లోరిఫైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. (లేక) కార్బాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 2 గ్రా./లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చెయ్యాలి.</li> <li>ప్రస్తుతం వరి నారు పోసుకునే రైతులు చలి ఎక్కువగా వున్న ప్రదేశాలలో అగ్రి తెగులును తట్టుకోనే NLR-34449, NLR-33541 వంటి రకాలను ఎన్నుకొని తప్పనిసరిగా విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.</li> <li>ప్రస్తుత వాతావరణంలో నారు మడిలో కాండం తొలుచు పురుగు కూడా ఆశించి నష్టపరిచేందుకు అవకాశం ఉన్నందున రైతులు అప్రమత్తంగా వుండి కార్బోఫ్యూరాన్ 3జి గుళికలు సెంటు నారు మడికి 160 గ్రా. చొ.న వెధజల్లుకోవాలి.</li> <li>ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులకు వరి పంటలో ఆకులు ఎండినట్లుగా కనబడి మొదలు నల్లగా మారి కాండం కుళ్ళి నష్టపరిచే అవకాశం వుంది. నివారణగా పొలంలో నీళ్ళు తీసివేసి ఆరబెట్టిన తరువాత హెక్సాకొనాజోల్ @2 మి.లీ లేదా ప్రోపికోనజోల్ @ 1 మి.లీ/లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చెయ్యాలి.</li> </ul>
వేరుశనగ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ప్రస్తుతం వేరుశనగ కోతలు చేపట్టే రైతులు విత్తనం కొరకు వాడు కాయలను బాగా ఆరబెట్టి కాయలో తేమ శాతం 9% వరకు ఉండేలా చూడాలి. కాయలను నిల్వ చేసేందుకు గాను మలాథయాన్ 5-10 మి.లీ./లీ. నీటికి చొ.న. కలిపిన ద్రావణంలో గొనె సంచులను అరగంట ముంచి భాగుగా ఎండబెట్టి ఆ తరువాత ఈ గొనె సంచులలో నిల్వ చేసుకోవాలి.</li> <li>ప్రస్తుతం 70-80 రోజుల వేరుశనగ పంటలో ఆకు మచ్చ తెగులు అధికమయ్యే అవకాశం ఉంది. నివారణగా హెక్సాకొనాజోల్ 2 మి.లీ./లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చెయ్యాలి.</li> </ul>
కంది	<ul style="list-style-type: none"> <li>ప్రస్తుతం మబ్బులతో కూడిన వాతావరణం ఉన్నందున ముందుగా వేసిన స్వల్పకాలిక మరియు స్థానిక కంది రకాలలో పంట మొగ్గ దశ చేరే అవకాశం వుంది. ఈ పరిస్థితులలో మారుకా మచ్చల పురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణగా క్లోరిఫైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. + డి.డి.వి.వి. 1 మి.లీ./లీ. నీటికి చొ.న. కలిపి పంట పై పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>
మైజ్	<ul style="list-style-type: none"> <li>రబీ మొక్క జొన్న విత్తుకోనేందుకు అనువైన సమయం. విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి. విత్తిన 24-48 గం.లలో నేలలో తేమ ఉండగానే అట్రజిన్ కలుపు మందు తేలిక నేలలలో ఎకరాకు 800 గ్రా. లేక బరువు నేలల్లో 1200 గ్రా. / 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>
ఫింగర్ మిలైట్	<ul style="list-style-type: none"> <li>ప్రస్తుత వాతావరణం రాగిలో అగ్రి తెగులు ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణగా ట్రైసైక్లోజోల్ 0.5 మి.లీ. /లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చెయ్యాలి.</li> </ul>
బ్లాక్ గ్రామ్	<ul style="list-style-type: none"> <li>ప్రస్తుత వాతావరణం మినుము మరియు పెసరలో ఆకుమచ్చ మరియు బూడిద తెగులు ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణగా మ్యాంకోజెబ్ 2.5 గ్రా. (లేక) క్లోరోథలోనిల్ 2 గ్రా. (లేక) కార్బండిజెం 1 గ్రా. (లేక) థయోఫినెట్ మిథైల్ 1 గ్రా./లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చెయ్యాలి.</li> </ul>
టమోటా	<ul style="list-style-type: none"> <li>ప్రస్తుతం టమోటా పంటలో ఆకు మాడు తెగులు ఆశించే అవకాశం వుంది. నివారణగా ప్రోపికోనజోల్ 1 మి.లీ. (లేక) క్లోరోథలోనిల్ 2 గ్రా. (లేక) మాంకోజెబ్ 2 గ్రా./లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చెయ్యాలి.</li> </ul>
టమోటా	<ul style="list-style-type: none"> <li>టమోటా పంటలో అక్కడక్కడా సూది పురుగు ఆశించి ఉన్నందున ఎకరాకు 10 చొ.న లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్చుకోవాలి. పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా వుంటే కోరాజెన్ 0.4 మి.లీ. / లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>

**ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా:**

ఉద్యానవన విభాగం	ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా
వంకాయలు	<ul style="list-style-type: none"> <li>ప్రస్తుతం కూరగాయ పంటలలో ఆకు తినే పురుగులు ఆశించే అవకాశం వుంది. నివారణగా క్వినాల్ఫాస్ 2 మి.లీ. (లేక) క్లోరిఫైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ./లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చెయ్యాలి.</li> </ul>
మిరప	<ul style="list-style-type: none"> <li>ప్రస్తుత వాతావరణం మిరపలో నారు కుళ్ళు ఆశించడానికి అనుకూలం. నారుకుళ్ళు నివారణగా కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ 3 గ్రా. / లీ. నీటికి (లేక) బోర్డాకస్ మిశ్రమం 1 శాతం పిచికారి చెయ్యాలి.</li> </ul>