



గ్రామీణ వ్యవసాయ వాతావరణ సేవా పథకము

భారత వాతావరణ సంస్థ

ఆదార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

లాం, గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్



వ్యవసాయ వాతావరణ బులెటిన్

వాతావరణ సూచన : 29-10-2020

చిత్తూర్(ఆంధ్రప్రదేశ్) యొక్క వాతావరణ సూచన - జారీ చేయబడింది :2020-10-29 (తదుపరి 5 రోజులలో 8:30 IST వరకు చెల్లుతుంది)

వాతావరణ కారకం	2020-10-30	2020-10-31	2020-11-01	2020-11-02	2020-11-03
వర్షపాతం (మి.మీ.)	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C)	32.1	34.1	34.4	35.3	35.0
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత (°C)	21.1	21.3	21.6	22.4	22.2
గాలిలో తేమ శాతం-ఉ (%)	68	85	79	84	90
గాలిలో తేమ శాతం-సా (%)	53	47	46	48	49
గాలి వేగం (కి.మీ./గంటకు)	10.4	7.8	7.4	5.7	6.5
గాలి దిశ (డిగ్రీ)	27	63	63	71	68
మబ్బు ఆవరణ (ఆక్షా)	8	5	3	3	2

వాతావరణ సూచనలు :

రాగల అయిదు రోజులలో ఆకాశం మేఘపృష్ఠ మై ఉండి అక్కడక్కడ తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉన్నది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 32-35 డిగ్రీ సెం.గాను కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 21-22 డిగ్రీ సెం.గాను నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నది.

సాధారణ సలహా:

మినుము, పెనర విత్తుకోనే రైతులు తప్పనిసరిగా కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. ఛైరామ్ / కాషాన్ తో విత్తన పుర్ణి చేసి విత్తుకోవాలి.

ఎస్.ఎం.ఎస్. సలహా:

రబీ వేరుశనగ విత్తేందుకు సిద్ధ పదుతున్న రైతులు ధరణి, నారాయణి, కదిరి-6 వంటి రకాలను ఎనుకొని విత్తనపుర్ణి చేసి విత్తుకోవాలి.

పంట ప్రత్యేక సలహా:

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వరి	<ul style="list-style-type: none"> ప్రస్తుత వాతావరణం వరిలో ఆగ్ని తెగులు ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణగా ప్రైస్ట్రెక్చర్జోల్ @ 0.6 మి.లీ.లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి. ప్రస్తుత వాతావరణం వరిలో పాముపాడు తెగులు ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణగా ప్రోపీనజోల్ 1 మి.లీ. (లేక) ఫొకాన్ నజోల్ 2 మి.లీ. (లేక) నేటివో 2 గ్రా. / లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వేరుశనగ	<ul style="list-style-type: none"> ప్రస్తుతం వేరుశనగ విత్తుకోనే రైతులు ధరణి, నారాయణి, కె-6, కె-7, కె-8, కదిరి అమరావతి, భీమ, TCGS-1157, TCGS-1073 పంటి రకాలను ఎన్నుకోని జమిడాక్షోప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్. 2 మీ.లీ. + 4 మీ.లీ. నీరు కిలో విత్తనానికి చొ.న. విత్తనపుద్ది చేసి ఆ తరువాత చేబుకోనబోల్ 1 గ్రా. కిలో విత్తనానికి చొ.న. కలిపి ఎకరానికి 60-70 కిలోల విత్తనం చొ.న వాడి, చ. మీ. కు 44 మొక్కలు ఉండేలా చూడాలి.
కంది	<ul style="list-style-type: none"> ప్రస్తుతం కంది మరియు ఇతర అపరాలలో మొగ్గ దశ మొదలయ్యే అవకాశం ఉన్నందున మారుకా మచ్చల పురుగు, శనగ పచ్చ పురుగు మరియు ఇతర కాయ తొలుచు పురుగులు ఆశించకుండా గ్రుడ్చు దశలోనే వేప నూనె 5 మి.లీ. + 1 గ్రా. సబ్బు పొడి (లేక) 5 శాతం వేప గింజల కపాయం (5% NSKE) (లేక) క్షోరపైరిపోస్ 2.5 మి.లీ. + డి.డి.వి.పి. 1 మి.లీ./లీ. నీలికి చొ.న. కలిపి పంట పై పిచికారి చేసుకోవాలి.
మైజ్	<ul style="list-style-type: none"> రబీ మొక్క జొన్న విత్తుకోనేందుకు అనువైన సమయం. విత్తన పుద్ది చేసి విత్తుకోవాలి. విత్తిన 24-48 గం.లలో నేలలో తేమ ఉండగానే అట్రజిన్ కలుపు మందు తేలిక నేలలలో ఎకరాకు 800 గ్రా. లేక బరువు నేలల్లో 1200 గ్రా. / 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.
టమోటా	<ul style="list-style-type: none"> టమోట పంటలో సూది పురుగు ఆశించి నష్టపరిచే అవకాశం వుంది. నివారణగా ఎకరాకు 10 చొ.న లింగాకర్క బుట్టలను అమర్పుకోవాలి. పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా వుంటే కొరాజన్ 0.4 మి.లీ. / లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.

ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా:

ఉద్యానవన విభాగం	ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా
ఫల్ల్ భీన్	ప్రస్తుత వాతావరణం చిక్కుడు జాతి పంటలలో పేను బంక ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణగా డైమీథోయేట్ 2 మి.లీ. (లేక) అసీఫేట్ 1.5 గ్రా./ లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.