



గ్రామీణ వ్యవసాయ వాతావరణ సేవా పథకము
భారత వాతావరణ సంస్థ
ఆదార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
లాం, గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్



వ్యవసాయ వాతావరణ బులెటిన్

వాతావరణ సూచన : 10-11-2020

చిత్తూర్(ఆంధ్రప్రదేశ్) యొక్క వాతావరణ సూచన - జారీ చేయబడింది :2020-11-10 (తదుపరి 5 రోజులలో 8:30 IST వరకు చెల్లుతుంది)

వాతావరణ కారకం	2020-11-11	2020-11-12	2020-11-13	2020-11-14	2020-11-15
వర్షపాతం (మి.మీ.)	0.0	2.0	4.0	5.0	2.0
గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత (°C)	31.0	30.7	30.8	29.0	30.6
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత (°C)	17.9	20.9	20.1	20.0	20.3
గాలిలో తేమ శాతం-ఉ (%)	84	94	95	96	93
గాలిలో తేమ శాతం-సా (%)	43	55	56	58	52
గాలి వేగం (కి.మీ./గంటకు)	11.4	12.5	9.5	11.2	14.2
గాలి దిశ (డిగ్రీ)	63	26	64	71	56
మబ్బు ఆవరణ (ఆక్షా)	4	7	8	7	6

వాతావరణ సూచనలు :

రాగల అయిదు రోజులలో ఆకాశం మేఘపృష్ఠ మై ఉండి అక్కడక్కడ తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉన్నది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 29-31 డిగ్రీ సెం.గాను కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 17-20 డిగ్రీ సెం.గాను నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నది.

సాధారణ సలహా:

పొడి వాతావరణం ఉన్నందున బాల్య దశలో వున్న వేరుశనగలో రసం పీల్చు పురుగులు నివారణగా మోనోక్రోటిఫాన్ 1.6 మి.లీ. / లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

ఎస్.ఎం.ఎస్. సలహా:

ప్రస్తుత వాతావరణం వరిలో అగ్గి తెగులు ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణగా చైనైక్లాజోల్ @ 0.6 మి.లీ./లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.

పంట ప్రత్యేక సలహా:

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వేరుశనగ	<ul style="list-style-type: none"> ప్రస్తుతం వేరుశనగ విత్తుకోనే రైతులు ధరణి, నారాయణి, కె-6, కె-7, కె-8, కదిరి అమరావతి, భీమ, TCGS-1157, TCGS-1073 వంటి రకాలను ఎన్నుకోని జమిడాక్షోపిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్. 2 మీ.లీ. + 4 మీ.లీ. నీరు కిలో విత్తనానికి చొ.న. విత్తనశుద్ధి చేసి ఆ తరువాత చేబుకోనబోల్ 1 గ్రా. (లేదా) మాంకోజెబ్ 3 గ్రా. కిలో విత్తనానికి చొ.న. కలిపి ఎకరానికి 60-70 కిలోల విత్తనం చొ.న వాడి, చ. మీ. కు 44 మొక్కలు ఉండేలా చూడాలి.
వరి	<ul style="list-style-type: none"> ప్రస్తుత వాతావరణం వరిలో అగ్గి తెగులు ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణగా చైనైక్లాజోల్ @ 0.6 మి.లీ./లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
కండి	<ul style="list-style-type: none"> ప్రస్తుతం మొగ్గ దశలో ఉన్న కందిలో మరుకా మచ్చల పురుగు, శనగ పచ్చ పురుగు వంటి కాయ తొలుచు పురుగు ఆశించకుండా గ్రుధ్య దశలోనే 5 శాతం వేపగింజల కపాయం (5% NSKE) పిచికారి చేసుకోవాలి. • పూత మొదలయ్యే దశలో ఉన్న పంటలో కోర్షైరఫాస్ 2.5 మి.లీ./లీ. (లేదా) క్వైనాల్ ఫాస్ 2.0 మి.లీ./లీ. (లేదా) అసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లీ. నీటికి చో.న. పిచికారి చేసుకోవాలి. • కాయ దశలో వున్నపుపుడు ఇండాకింకార్బ్ 1 మి.లీ. (లేక) సైన్సోసాడ్ 0.3 మి.లీ./లీ. నీటికి చో.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.
మైజ్	<ul style="list-style-type: none"> రబీ మొక్క జొన్న విత్తుకోనేందుకు ప్రస్తుతం అనువైన సమయం. విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి. విత్తిన 24-48 గం.లలో నేలలో తేమ ఉండగానే అట్లజిన్ కలుపు మందు తెలిక నేలలలో ఎకరాకు 800 గ్రా. లేక బరువు నేలల్లో 1200 గ్రా. / 200 లీ. నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.
టుమోటూ	<ul style="list-style-type: none"> టుమోట పంటలో సూది పురుగు ఆశించి నష్టపరిచే అవకాశం వుంది. నివారణగా ఎకరాకు 10 చో.న లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్పుకోవాలి. పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా వుంచే కొరాజన్ 0.4 మి.లీ./లీ. నీటికి చో.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.

ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా:

ఉద్యానవన విభాగం	ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా
వంకాయలు	<p>వంగలో కొమ్మ మరియు కాయ తొలుచు పురుగు నివారణకు పురుగు సోకిన కొమ్మలను తుంచి దూరంగా పారవేయవలెను. ఫిరమోన్ ట్రోప్స్ ఎకరాకు 8 చౌపున అమర్పుకోవాలి. పురుగు ఉధృతిని బట్టి నివారణగా సైన్సోసాడ్ 0.3 మి.లీ./లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.</p>