



## గ్రామీణ వ్యవసాయ వాతావరణ సేవా పథకము

భారత వాతావరణ సంస్థ

ఆదార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
లాం, గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్



# వ్యవసాయ వాతావరణ బులెటిన్

వాతావరణ సూచన : 04-12-2020

**చిత్తూర్(ఆంధ్రప్రదేశ్) యొక్క వాతావరణ సూచన - జారీ చేయబడింది :2020-12-04 ( తదుపరి 5 రోజులలో 8:30 IST వరకు చెల్లుతుంది)**

వాతావరణ కారకం	2020-12-05	2020-12-06	2020-12-07	2020-12-08	2020-12-09
వర్షపాతం (మి.మీ.)	13.0	12.0	9.0	2.0	2.0
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C)	26.6	26.5	27.4	27.0	28.0
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత (°C)	20.7	21.5	20.9	19.4	18.1
గాలిలో తేమ శాతం-ఉ (%)	96	96	96	96	93
గాలిలో తేమ శాతం-సా (%)	78	80	78	74	58
గాలి వేగం (కి.మీ./గంటకు)	23.4	22.6	19.5	14.8	11.9
గాలి దిశ (డిగ్రీ)	68	68	68	70	63
ముఖ్య ఆవరణ (ఆక్షా)	7	7	5	5	5

### **వాతావరణ సూచనలు :**

రాగల అయిదు రోజులలో ఆకాశం మేఘపృష్ఠ మైదానాలలో ఉండి తేలికపాటి నుంచి ఒక మొస్తురు వర్షం అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 26-28 డిగ్రీ సెం.గాను కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 19-21 డిగ్రీ సెం.గాను నమోదయే అవకాశం ఉన్నది.

### **సాధారణ సలహా:**

గత వారం కురిసిన వర్షాలకు శిల్పింధ్రపు తెగులు ఆశించకుండా వేరుశనగలో హెక్సాకోనజోల్ 2 మి.లీ. / లీ. నీటికి దొ.న కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.

### **ఎస్.ఎం.ఎస్. సలహా:**

పొలాల్లో వున్న అధిక తేమ దృష్ట్యా రైతులు వేరుశనగ 2-3 రోజులు ఆగి ఆ తరువాత విత్తుకోవాలి.

### **పంట ప్రత్యేక సలహా:**

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
-----	-------------------

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వరి	<ul style="list-style-type: none"> <li>• అధిక వర్షాలకు పొలాలలో నిలచిన నీటిని వీలయినంత త్వరగా వెలుపలకి పంపాలి. • పక్వ దశ నుంచి కోత దశ వరకు వుండి గత వారం కురిసిన వర్షాలకు అధిక గాలులకు పొలం లో నీరు నిలచి పొలం పై పడిపోయిన వరి పంటకు 5 శాతం ఉపుగు నీరు ద్రావణాన్ని పిచికారి చేసుకోవాలి. • పొలం నుంచి వెన్నులు తీసి వేసి కళ్ళల్లో కుప్పులు వేసిన తరువాత కూడా 5 శాతం ఉపుగు నీరు ద్రావణాన్ని పిచికారి చేసుకోవాలి. • నారు మదులు పూర్తిగా పొడిచి పొడవకుండా ఉన్నచో నారు మడి నుంచి పూర్తిగా నీటిని వెలుపలకి పంపి సెంటుకు అర కిలో యూరియా చో.న వెదజల్లుకోవాలి. • ఇంకా 2, 3 రోజులు ఒక మౌస్తరు వర్ష సూచన వున్న దృష్ట్యా నారు మదులు / పిలక దశలో వున్న పంట కుళ్ళిపోకుండా బావిస్థిన్ 1 గ్రా.లీ. నీటికి చో.న పిచికారి చేయాలి. • ప్రధాన వరి పొలాల్లో నీరు వెలుపలకి పంపిన తరువాత పొడి వాతావరణం వున్న రోజున ఎకరాకు 20 కిలోల యూరియ, 10 కిలోల పోటాష్ చో.న వెదజల్లుకోవాలి. • ప్రస్తుతం కురిసిన వర్షాలకు వరిలో గింజ రంగు మారి నల్ల నొక్కు తెగులు ఆశించే అవకాశం వుంది. వర్షం ఆగిన వెంటనే నివారణగా ప్రోపికోనజోల్ 1 మీ.లీ. లీటరు నీటికి చో.న కలిపి వెన్నులు తాడిచేల పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>
వేరుశనగ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుతం విసారంగా కురిసిన వర్షాలకు నేలలో తేమ అధికంగా ఉన్నందున రబీ వేరుశనగ చేపట్టే రైతులు రెండు నుంచి మూడు రోజులు ఆగి ఆ తరువాత వేరుశనగ విత్తుకోవాలి. • వేరుశనగ విత్తే రైతులు తప్పనిసరిగా ఇమిడాక్షోప్రైట్ 600 ఎఫ్.ఎస్. 2 మీ.లీ. + 4 మీ.లీ. కిలో విత్తనానికి చో.న. ఆ తరువాత చేబుకోనజోల్ 1 గ్రా. కిలో విత్తనానికి చో.న. కలిపి విత్తనసుద్ది చేసి విత్తుకోవాలి.</li> </ul>
టమోటా	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుత వాతావరణం టమాటో పంటలో ముందుగా ఆశించు ఆకు మాడు తెగులుకు అనుకూలం. నివారణగా మాంకోజెన్ (లేదా) క్లోరోథలోనిల్ 2 గ్రా. (లేదా) ప్రోపికోనజోల్ 1 మీ.లీ. లీటరు నీటికి చో.న 15 రోజుల వ్యవధిలో రెండు లేక మూడు సార్లు పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>

### ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా:

ఉద్యానవన విభాగం	ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా
మావిడి	<ul style="list-style-type: none"> <li>• గత వారం కురిసిన వర్షాలకు అనేక చోట్ల మామిడి పంటలో పోషక లోపము కనబడే అవకాశం వుంది. నివారణగా రైతులు ఎరువులు వేసుకుని సూక్ష్మ పోషక లోప నివారణగా లీటరు నీటికి 5 గ్రా. జింకు సల్పేట్ + 2.5 గ్రా. పెర్రన్ సల్పేట్ + 2 గ్రా. బోరాక్స్ + 2 గ్రా. కాల్షియమ్ సల్పేట్ + 3 గ్రా. మెగ్నెషియం సల్పేట్ కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>
బోప్పాయి	<ul style="list-style-type: none"> <li>• గత వారం కురిసిన వర్షాలకు బోప్పాయిలో వేరుకుళ్ళు తెగులు ఆశించే అవకాశం ఉంది. నివారణగా కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి మొక్క మొదళళును తడపాలి. • శిలీంద్ర తెగులు ఉధృతి పెరగకుండా లీటరు నీటికి 1 గ్రా. కార్బండిజెం చో.న కలిపి మొక్కల్లో పిచికారి చేయాలి.</li> </ul>
మిరప	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుతం కురిసిన వర్షాలకు మిరప నారు మదులల్లో నారు కుళ్ళు తెగులు ఆశించి నష్టపరిచే అవకాశం వుంది. నివారణగా 3 గ్రా. కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ లీటరు నీటితో కలిపి లేదా 1 శాతం బోర్డ్ మిశ్రమంతో కలిపి పిచికారి చేయాలి.</li> </ul>
వంకాయలు	<ul style="list-style-type: none"> <li>వంగలో కొమ్మ మరియు కాయ తీలుచు పురుగు నివారణకు పురుగు సోకిన కొమ్మలను తుంచి దూరంగా పారవేయవలెను. ఫిరమోన్ ట్రోపస్ ఎకరాకు 8 చోపున అమర్యుకోవాలి. పురుగు ఉధృతిని బట్టి నివారణగా స్ట్రోసార్డ్ 0.3 మీ.లీ. (లేక) ఇమామ్ఫోన్ బెంబోయేట్ 0.25గ్రా. (లేక) లారిఫ్న్ 1 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>