



గ్రామీణ వ్యవసాయ వాతావరణ సేవా పథకము

భారత వాతావరణ సంస్థ

ఆదార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

లాం, గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్



వ్యవసాయ వాతావరణ బులెటిన్

వాతావరణ సూచన : 08-12-2020

చిత్తూర్(ఆంధ్రప్రదేశ్) యొక్క వాతావరణ సూచన - జారీ చేయబడింది :2020-12-08 (తదుపరి 5 రోజులలో 8:30 IST వరకు చెల్లుతుంది)

వాతావరణ కారకం	2020-12-09	2020-12-10	2020-12-11	2020-12-12	2020-12-13
వర్షపాతం (మి.మీ.)	14.0	4.0	0.0	0.0	0.0
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C)	27.3	28.2	29.7	29.0	29.0
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత (°C)	20.7	19.4	19.4	20.1	20.4
గాలిలో తేమ శాతం-ఉ (%)	96	96	93	90	89
గాలిలో తేమ శాతం-సా (%)	83	75	58	53	52
గాలి వేగం (కి.మీ./గంటకు)	12.3	15.4	15.1	14.7	14.2
గాలి దిశ (డిగ్రీ)	77	70	68	71	71
ముఖ్య ఆవరణ (ఆక్షా)	8	5	1	3	2

వాతావరణ సూచనలు :

రాగల అయిదు రోజులలో ఆకాశం మేఘపృష్ఠ మైదానాలలో ఉండి తేలికపాటి నుంచి ఒక మొస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 27-29 డిగ్రీ సెం.గాను కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 19-21 డిగ్రీ సెం.గాను నమోదుచేయే అవకాశం ఉన్నది.

సాధారణ సలహా:

ప్రస్తుత వాతావరణం వరిలో అగ్గి తేగులు ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణగా లైస్టేషన్జోల్ @ 0.6 మి.లీ./లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.

ఎస్.ఎం.ఎస్. సలహా:

పొడి వాతావరణం వున్న పరిస్థితులలో విత్తుటకు తగినంత తేమ ఉన్నపుడు డిసెంబరు మొదటి ప్రక్కంలో వేరుశనగ విత్తుకోవాలి

పంట ప్రత్యేక సలహా:

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వేరుశనగ	<ul style="list-style-type: none"> ప్రస్తుతం రబీ వేరుశనగ విత్తుతున్న రెతులు ధరణి, నారాయణ, కె-6, కె-7 మరియు కె-8 బోల్ట్, కదిరి అమరావతి, భీమ వంటి రకాలను ఎన్నుకోని మొఘ్య కుళ్ళు ఆశించకుండా తప్పనిసరిగా ఇమిడాక్స్ ప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్ @ 2 మి.లీ. + 4 మి.లీ. నీరు కిలో విత్తనానికి కలిపి విత్తన శద్ది చేసి, అరగంట నీడలో ఆరబెట్టి, తరువాత విత్తనానికి ఐబుకోనజోల్ 1 గ్రా. (లేదా) మాంకోజెబ్ 3 గ్రా. కిలో విత్తనానికి చోప్పున కలిపి విత్తన శద్ది చేసి, ఎకరాకు 70-80 కిలోల విత్తనాన్ని చదరపు మీటరుకు 44 మొక్కలు ఉండేలా చూసి విత్తుకోవాలి.

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వరి	<ul style="list-style-type: none"> • ప్రస్తుతం వరిలో జింకు ధాతు లోపం కనిపించే అవకాశం వుంది. నివారణకు 2 గ్రా. జింకు సల్పేట్ మరియు 10 గ్రా. యూరియా/లీటరు నీటికి చో.న. పిచికారి చేసుకోవాలి. • ప్రస్తుతం బ్యారీయా ఆకు ఎండు తెగులు ఆశించే అవకాశం వుంది. నివారణగా ప్రాటుగా వేయు నత్రజని ఎరువును త్తాత్త్వాలికంగా నిలిపి పొలంలో నీరు ఎక్కువ రోజులు నిలువ ఉండకుండా మురుగు నీటి కాలువల ద్వారా వెలుపలకు పంపాలి. • ప్రధాన వరి పొలాల్లో నీరు వెలుపలకి పంపిన తరువాత పొడి వాతావరణం వున్న రోజున ఎకరాకు 20 కిలోల యూరియు, 10 కిలోల పోటొవ్ చో.న వెదజల్లుకోవాలి.
బ్లాక్ గ్రామ్	<ul style="list-style-type: none"> • ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులకు మినుము మరియు పెసరలో ఆకుమచ్చ మరియు బూడిద తెగులు ఆశించి నష్టపరిచే అవకాశం వుంది. నివారణగా మాంకోజెబ్ 2.5 గ్రా. (లేక) క్లోరోథలోనిల్ 2 గ్రా. (లేక) కార్బండిజెం 1 గ్రా. (లేక) థయోఫినేట్ మిథ్రైల్ 1 గ్రా./లీ. నీటికి చో.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.
కంది	<ul style="list-style-type: none"> • ప్రస్తుతం కందిలో శనగ పచు పురుగు ఆశించే అవకాశం వుంది. పురుగు లేత దశలో వున్నపుండు క్లోరైప్రైఫాస్ 2 మి.లీ./లీ. (లేదా) అసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లీ. నీటికి చో.న. పిచికారి చేసుకోవాలి. పురుగు రెండో దశలో వుంచే వీటితో పొటు నువ్వు 0.5 మి.లీ./లీ. నీటికి చో.న. పిచికారి చేసుకోవాలి. పురుగు ఉధృతి అధికంగా వుంచే లార్యోన్ 1.5 గ్రా./ లీ. నీటికి చో.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.
పశుగ్రాసం మేజ్	<ul style="list-style-type: none"> • ప్రస్తుత వాతావరణంలో గడ్డి మెక్కజోన్సులో కత్తెర పురుగు ఆశించే అవకాశం వుంది. నివారణగా ఎమమెక్స్ బెంజోయేట్ 5 ఎస్.బి. 0.4 మి.లీ./లీ. నీటికి (లేక) క్రోంట్రినిలిపోల్ 0.4 మి.లీ./లీ. నీటికి చో.న. నుడులు (లేదా) మొవ్వు లోపలి ఆకులు తడిచేల పిచికారి చేయాలి.
టమోటా	<ul style="list-style-type: none"> • ప్రస్తుత వాతావరణం టమాటో పంటలో ముందుగా ఆశించు ఆకు మాడు తెగులుకు అనుకూలం. నివారణగా మాంకోజెబ్ (లేదా) క్లోరోథలోనిల్ 2 గ్రా. (లేదా) ప్రోపికోనజోల్ 1 మి.లీ. లీటరు నీటికి చో.న 15 రోజుల వ్యవధిలో రెండు లేక మాడు సార్లు పిచికారి చేసుకోవాలి.

ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా:

ఉద్యానవన విభాగం	ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా
మిరప	<ul style="list-style-type: none"> • ప్రస్తుతం కురిసిన వద్దాలకు మిరప నారు మడులల్లో నారు కుళ్ళు తెగులు ఆశించి నష్టపరిచే అవకాశం వుంది. నివారణగా 3 గ్రా. కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ లీటరు నీటితో కలిపి లేదా 1 శాతం బోర్డో మిశ్రమంతో కలిపి పిచికారి చేయాలి. • ప్రస్తుతం మిరపలో వేరు కుళ్ళు తెగులు ఆశించి నష్టపరిచే అవకాశం వుంది. నివారణగా 3 గ్రా. కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ లీటరు నీటితో కలిపి పిచికారి చేసుకోని, పేడు డ్రయువులతో కలిపిన ప్లైకోడర్కు విరిది ని చల్లుకోవాలి.
వంకాయలు	<ul style="list-style-type: none"> • వంగ, బెండ వంటి కూరగాయ పంటలలో కాయతోలుచు పురుగు ఆశించి నష్ట పరిచే అవకాశం ఉంది. నివారణగా క్లోరైప్రైఫాస్ 2 మి.లీ./లీటరు నీటికి చో.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.
మావిడి	<ul style="list-style-type: none"> • గత వారం కురిసిన వద్దాలకు అనేక చోట్ల మామిడి పంటలో పోపక లోపము కనబడే అవకాశం వుంది. నివారణగా రైతులు ఎరువులు వేసుకుని సూక్ష్మ పోపక లోప నివారణగా లీటరు నీటికి 5 గ్రా. జింకు సల్పేట్ + 2.5 గ్రా. ఫుర్స్ సల్పేట్ + 2 గ్రా. బోరాక్స్ + 2 గ్రా. కాల్చియమ్ సల్పేట్ + 3 గ్రా. మెగ్నెషియం సల్పేట్ కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.