



గ్రామీణ వ్యవసాయ వాతావరణ సేవా పథకము

భారత వాతావరణ సంస్థ

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

లాం, గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్



వ్యవసాయ వాతావరణ బులెటిన్

వాతావరణ సూచన : 29-04-2022

చిత్తూర్(ఆంధ్రప్రదేశ్) యొక్క వాతావరణ సూచన - జారీ చేయబడింది :2022-04-29 (తదుపరి 5 రోజులలో 8:30 IST వరకు చెల్లుతుంది)

| వాతావరణ కారకం | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| వర్షపాతం (మి.మీ.) | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 |
| గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C) | 39.8 | 40.0 | 39.7 | 39.5 | 39.6 |
| కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C) | 25.3 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | 25.5 |
| గాలిలో తేమ శాతం-ఉ (%) | 67 | 64 | 66 | 72 | 74 |
| గాలిలో తేమ శాతం-సా (%) | 33 | 31 | 34 | 35 | 33 |
| గాలి వేగం (కి.మీ./గంటకు) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
| గాలి దిశ (డిగ్రీ) | 150 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| మబ్బు ఆవరణ (ఆక్టా) | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |

వాతావరణ సూచనలు:

రాగల అయిదు రోజులలో ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై వుండి అక్కడక్కడ తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉన్నది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 39-40 డిగ్రీ సెం.గాను కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 25-26 డిగ్రీ సెం.గాను నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నది.

సాధారణ సలహా:

ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నందున రైతులు కోళ్లు, మేకలు, గొర్రెలు మరియు పశువులకు దగ్గర దగ్గరగా త్రాగు నీరు అందించాలి.

ఎస్.ఎం.ఎస్. సలహా:

అధిక ఉష్ణోగ్రతలు మరియు వర్ష సూచన ఉన్నందున రైతులు పంటల కోత అనంతర జాగ్రత్తలు చేపట్టాలి

పంట ప్రత్యేక సలహా:

| పంట | పంట ప్రత్యేక సలహా |
|---------|--|
| వేరుశనగ | • వేసవి వేరుశనగగా ఏప్రిల్ మాసంలో వేరుశనగ విత్తుకొనే రైతులు పంటలో రసం పీల్చు పురుగులు మరియు మొదలు కుళ్ళు శిలీంధ్రం తెగులు ఆశించకుండా విత్తన శుద్ధి తప్పకుండా చెయ్యాలి. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 600 ఎఫ్.ఎస్ @ 2 మి.లీ. + 4 మి.లీ. నీరు కిలో విత్తనానికి చొప్పున కలిపి అరగంట నీడలో ఆరబెట్టి, తరువాత విత్తనానికి పుబుకొనజోల్ 1 గ్రా. (లేదా) మాంకొజెబ్ 3 గ్రా. కిలో విత్తనానికి చొప్పున విత్తుకొవాలి. |
| వరి | • ప్రస్తుతం ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నందున వరిలో కాండం కుళ్ళు ఆశించే అవకాశం వుంది. నివారణకు టిల్డ్ @ 1 మి.లీ.లీ. (లేక) పుబుకొనజోల్ @ 1.5 మి.లీ. నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి. |

| పంట | పంట ప్రత్యేక సలహా |
|----------------|---|
| పశుగ్రాసం మేజ్ | • నీటి వసతి గల భూముల్లో జొన్న, మొక్కజొన్న మరియు సజ్జ రకాల పసుగ్రాసాన్ని పెంచుకోవచ్చు మరియు 45-50 రోజుల తర్వాత పచ్చిగడ్డి కోసుకోవచ్చు. |
| చెరుకుగడ్డ | • ప్రస్తుతం చెరకు పంటలో పీక పురుగు ఆశించి నష్టపరిచేందుకు అనువుగా వుంది. నివారణగా పంట నీటి ఎద్దడికి గురి కాకుండా క్రమబద్ధమైన నీటి తడులు ఇవ్వాలి. క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 మీ.లీ. / లీ. నీటికి చొప్పున కలిపి పంటపై పిచికారీ చేసుకోవాలి. |

ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా:

| ఉద్యానవన విభాగం | ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా |
|-----------------|--|
| మావిడి | • ప్రస్తుతం మామిడిలో పండు ఈగ ఆశించి నష్టపరిచేందుకు అవకాశం వుంది. నివారణగా ఫిరమోన్ ఎరలను ఎకరాకు 8-10 చొప్పున భిఠామి నుంచి 3-6 అడుగుల ఎత్తులో అమర్చుకోవాలి. |
| టమోటా | ప్రస్తుతం టమోటా పంటలో అక్కడక్కడా సూది పురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఎకరాకు 10 చొ.న లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్చుకోవాలి. పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా వుంటే కొరాజెన్ 0.4 మీ.లీ. / లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి. |