



## గ్రామీణ వ్యవసాయ వాతావరణ సేవా పథకము

భారత వాతావరణ సంస్థ

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

లాం, గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్



# వ్యవసాయ వాతావరణ బులెటిన్

వాతావరణ సూచన : 28-03-2023

చిత్తూర్(ఆంధ్రప్రదేశ్) యొక్క వాతావరణ సూచన - జారీ చేయబడింది :2023-03-28 ( తదుపరి 5 రోజులలో 8:30 IST వరకు చెల్లుతుంది)

| వాతావరణ కారకం            | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| వర్షపాతం (మి.మీ.)        | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 10.0       |
| గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C)    | 35.5       | 35.7       | 36.0       | 36.2       | 36.4       |
| కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C)    | 24.4       | 24.5       | 24.3       | 24.0       | 24.6       |
| గాలిలో తేమ శాతం-ఉ (%)    | 74         | 72         | 75         | 77         | 76         |
| గాలిలో తేమ శాతం-సా (%)   | 53         | 50         | 48         | 45         | 49         |
| గాలి వేగం (కి.మీ./గంటకు) | 9.0        | 8.0        | 9.0        | 8.0        | 9.0        |
| గాలి దిశ (డిగ్రీ)        | 160        | 150        | 160        | 160        | 180        |
| మబ్బు ఆవరణ (ఆక్టా)       | 4          | 5          | 4          | 5          | 4          |

### వాతావరణ సూచనలు:

రాగల అయిదు రోజులలో ఆకాశం మేఘావృతమై వుండి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 35-36 డిగ్రీ సెం.గాను కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 24-25 డిగ్రీ సెం.గాను నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నది.

### సాధారణ సలహా:

మామిడిలో తామర పురుగుల నివారణగా అజాడిరక్టన్ 2 మి.లీ. (లేక) వేపనూనె 10 మి.లీ./లీ. నీటికి చొ.న పిచికారి చేసుకోవాలి.

### ఎస్.ఎం.ఎస్. సలహా:

వేరుశనగ కోత చేపడుతున్న రైతులు కాయలను మధ్యాహ్నం వరకు ఆరబెట్టి కాయలో తేమ 9% ఉండేలా నిల్వ చేసుకోవాలి.

### పంట ప్రత్యేక సలహా:

| పంట     | పంట ప్రత్యేక సలహా   |
|---------|---|
| వేరుశనగ | • ప్రస్తుతంరబీ వేరుశనగ కోత చేపట్టుతున్న రైతులు విత్తనం కొరకు వాడు కాయలను వేసవిలో నేరుగా మధ్యాహ్నం వరకు నీడలో ఆరబెట్టి కాయలో తేమ శాతం 9% వరకు ఉండేలా చూడాలి.   |
| వరి     | • ప్రస్తుత వాతావరణం వరిలో కాండం తొలుచు పురుగు ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణగా క్లోరిఫైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. (లేక) క్లోరంథ్రనిలిప్రోల్ 0.3 మి.లీ./లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి. • ప్రస్తుతం ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూ ఉక్కపోతతో కూడిన వాతావరణం వుండే అవకాశం ఉన్నందున పక్క దశలో వున్న వరిలో సుడిదోమ ఆశించే అవకాశం వుంది. నివారణగా మొక్కలకు గాలి, వెలుతురు తగిలేలా పాయలు తీసి |

| పంట        | పంట ప్రత్యేక సలహా  |
|------------|--|
|            | బుప్రోఫెజిన్ @ 1.5 మి.లీ. (లేక) ఇతోఫెన్ ప్రాక్స్ @ 2 మి.లీ./లీ. నీటికి చొ.న. కలిపి పంట పై పిచికారి చేయాలి.   |
| చెరుకుగడ్డ | <ul style="list-style-type: none"> <li>ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులకు చేరకుండా కాండం తొలుచు పురుగు ఆశించి నష్టపరిచే అవకాశం ఉంది. నివారణగా ఆలస్యంగా వచ్చిన పిలకలను తీసివేసి మురుగు నీటిపారుదల సౌకర్యం ఉండేలా చూడాలి.</li> <li>ప్రైకోగ్రామ ఖిలోనిన్ గుడ్డు పరాన్నజీవిని ఎకరాకు 20,000 చొ.న 120 రోజుల నుండి ప్రతి 7-10 రోజుల వ్యవధిలో 6-8 సార్లు పైరులో వదలాలి.</li> <li>మొక్క క్రింద ఎండుటాకులను రెలచి క్లోరిఫైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ. (లేక) మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ./లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul> |
| మొజ్జ      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ప్రస్తుతం వేసవి పంటగా గడ్డి జొన్న, గడ్డి మొక్కజొన్న వంటి పంటలు విత్తుకొనే రైతులు బాల్య దశలో కత్తెర పురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణగా బాల్య దశలో వేపనూనె 5 మి.లీ./లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకొని 15 రోజుల తరువాత ధయోడికార్బ్ 2 గ్రా./లీ. నీటికి చొ.న పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>  |

**ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా:**

| ఉద్యానవన విభాగం | ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా   |
|-----------------|---|
| మావిడి          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులకు మామిడి పంటలో తేనెమంచు పురుగులు ఆశించి నష్టపరిచే అవకాశం ఉంది. నివారణగా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.3 మి.లీ./లీ. నీటికి చొ.న పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> <li>ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు మామిడిలో తామర పురుగుల ఉధృతి అధికమయ్యేందుకు అనుకూలం. నివారణగా అజాడిరక్టిన్ 1500 పి.పి.ఎం. 2 మి.లీ. (లేక) వేప నూనె 10 మి.లీ./లీ. నీటికి చొ.న పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> <li>ప్రస్తుతం ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూ ఉన్నందున 15 రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు చొ.న తోటలకి నీరు అందించాలి. దీని వలన పిందె పెరుగుదల బాగా ఉండి పిందె రాలుట తగ్గుతుంది.</li> <li>ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులకు పిందె రాలుట అధికంగా ఉన్నట్లయితే నివారణగా ప్లానోఫిక్స్ 1 మి.లీ./4.5 లీ. నీటికి చొ.న కలిపి మొగ్గ మరియు పూతపై పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul> |
| కస్తూరి మెలోన్  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులకు దోస మరియు పుచ్చు పంటలలో తామర పురుగులు ఆశించి వైరస్ తెగుళ్ళు వ్యాపింపజేసే అవకాశం ఉంది. తామర పురుగుల నివారణగా స్పైనోసాడ్ 0.35 మి.లీ./లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>  |