



**ఉద్యానవనస్థాన ప్రత్యేక కరణం**

నీరుగా వరి విత్తే రైతులు విత్తిన 3-5 రోజులప్పుడు కలుపు వరి నివారణగా ఫెరజోసల్ఫురాన్ ఇథెల్ ఎకరాకు 80 గ్రా. చొప్పున ఒక లీటరు నీటిలో కలిపిన

<p><b>ఉద్యానవనస్థాన విభాగం</b></p>	<p>ణాన్ని 20 కిలోల ఇసుకలో కలిపి సమానంగా వెదజల్లుకోవాలి. ఉద్యానవనస్థాన ప్రత్యేక కరణం ప్రస్తుత వాతావరణంలో వేరుశనగ పంటలో రసం పల్చువురుగులు ఆశించి నష్టపరిచే</p>
<p><b>వేరుశనగ</b></p>	<p>అవకాశం ప్రస్తుత వివరణలోని తీరు ప్రకారం పంట పురుగులు ఆశించి నష్టం కలిగిస్తున్నాయి. (లేక) ట్రైకోటెనా వాగ్రలీన్ / జోటిక్స్ / మకలి ఫిత్ కు కైడిచేతన్ వాల్స్ • ప్రస్తుతం నీటికి వేరుశనగ పంటకు వేరుశనగ పంటలు ఆశించడానికి అనుకూలం. నివారణగా</p>
<p><b>మావిడి</b></p>	<p>ఇమ్మోక్షోప్రోత్రి. మోమిడిలో. తీర్చుకోవడానికి వేరుశనగ పంటలకు కొమ్మ కత్తిరింపులు చేపట్టని తోటల్లో ఆండ్రాక్సోస్ ఆకు మచ్చ తెగులు, బ్లాక్ బ్యాండ్ తెగులు మరియు బంక తెగులు అధికంగా ఆశించి నష్టపరిచే అవకాశం వుంది. నివారణగా కొమ్మ కత్తిరింపులు చేపట్టి ఏదేని కాపర్ శిలీంధ్ర నాశిని మందులు 1% బోర్డో మిశ్రమంతో కలిపి వేసుకోవాలి. • పై తెగులను ప్రస్తుతం నివారించనిచో ఇవి పూత దశలో కూడ వ్యాపించి దిగుబడులు తగ్గే అవకాశం వుంది.</p>
<p><b>టమోటా</b></p>	<p>• పండు ఈగ అధికంగా ఆశించే అవకాశం వున్న దున్న మిథైల్ యుజనాల్ బుట్టలు ఎకరాకు 6 చొ.న అమర్చి మలధయాన్ 2 మి.లీ. మరియు కొంత బెల్లం లీటరు నీటికి చొ.న కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి. పురుగు ఉధృతి అధికంగా వుండి ఆడ పండు ఈగ కూడ ఉన్నట్లయితే ప్రోటీన్ హైడ్రోలైసేట్ 10 గ్రా. మరియు మలతయాన్ 2 మి.లీ. కొంత బెల్లము లీటరు నీటికి చొ.న కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.</p>
<p><b>పంకాయలు</b></p>	<p>వంగ, బెండ వంటి కూరగాయ పంటలలో కాండం మరియు కాయ తొలుచు పురుగు ఆశించి నష్ట పరిచే అవకాశం వుంది. నివారణకు క్వినాలఫాస్ 2 మి.లీ. (లేక) మోనోక్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ. (లేక) క్లోరిఫైరిఫాస్ 2 మి.లీ./లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.</p>