



గ్రామీణ వ్యవసాయ వాతావరణ సేవా పథకము

భారత వాతావరణ సంస్థ

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

లాం, గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్



వ్యవసాయ వాతావరణ బులెటిన్

వాతావరణ సూచన : 31-05-2024

చిత్తూర్(ఆంధ్రప్రదేశ్) యొక్క వాతావరణ సూచన - జారీ చేయబడింది :2024-05-31 (తదుపరి 5 రోజులలో 8:30 IST వరకు చెల్లుతుంది)

వాతావరణ కారకం	2024-06-01	2024-06-02	2024-06-03	2024-06-04	2024-06-05
వర్షపాతం (మి.మీ.)	2.0	16.0	20.0	6.0	10.0
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C)	40.5	40.4	39.8	37.8	39.6
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C)	30.4	29.4	27.5	28.2	27.4
గాలిలో తేమ శాతం-ఉ (%)	62	64	58	62	60
గాలిలో తేమ శాతం-సా (%)	46	42	40	45	42
గాలి వేగం (కి.మీ./గంటకు)	10	8	10	8	10
గాలి దిశ (డిగ్రీ)	310	290	320	280	290
మబ్బు ఆవరణ (ఆక్షా)	5	8	8	5	8

వాతావరణ సూచనలు:

రాగల అయిదు రోజులలో ఆకాశం మేఘావృతమై వుండి తేలికపాటి జల్లుల నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 38-40 డిగ్రీ సెం.గాను కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 27-30 డిగ్రీ సెం.గాను నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నది.

సాధారణ సలహా:

వరి నారు మడులు పోసుకొన్న రైతులు నారు పీకే వారం రోజుల ముందర కార్బోప్యూరాన్ 3జి గుళికలు సెంటుకు 160 గ్రా. చొ.న వెదజల్లుకోవాలి.

ఎస్.ఎం.ఎస్. సలహా:

వేరుశనగ విత్తదలచుకున్న రైతులు విత్తేందుకు తొందర పడకుండా లోతు దుక్కులు దున్నుకోవాలి.

పంట ప్రత్యేక సలహా:

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వేరుశనగ	<ul style="list-style-type: none"> జూన్ లో వర్షాధారంగా వేరుశనగ విత్తదలచుకున్న రైతులు నారాయణి, ధరణి, కె-9, ఐ.సి.జి.వి.-9114 వంటి రకాలను, కొంత నీటి వసతి ఉన్న చోట్ల గ్రీష్మ, కె-6, ధీరజ్, నిత్యహరిత వంటి రకాలను ఎన్నుకొని మాంకోజెబ్ (లేక) టేబుకోనజోల్ 3 గ్రా./కేజి విత్తనానికి చొప్పున విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి. • జూన్ లో విత్తే రైతులు తప్పనిసరిగా చదరపు మీటరుకు 33 మొక్కలు పడేలా విత్తుకోవాలి. • రక్షక పంటగా పొలం చుట్టూ 5-6 వరుసలలో జొన్న గాని సజ్జ గని విధిగా వేసుకోవాలి. దీనివలన వైరస్ తెగుళ్ళను వ్యాపింపజేసే కీటకాలను పంట మీదకు రాకుండా అరికట్టవచ్చు.

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వరి	<ul style="list-style-type: none"> • ప్రస్తుతం వరి నారు మడులు పోసుకొన్న రైతులు నారు పీకే వారం రోజుల ముందర కార్బోప్యూరాన్ 3జి గుళికలు సెంటుకు 160 గ్రాముల చొప్పున వెధజల్లుకోవాలి. • నారు మడులు గట్టిగ వున్నప్పుడు నారు తీత కష్టమై వేరు తెగే అవకాశం ఉన్నందున నారు పీకే వారం రోజుల ముందర సెంటుకు 4-6 కిలోల జిప్సం ను వేసుకొని ఆ తరువాత నారు తీయాలి.
చెఱుకు	<ul style="list-style-type: none"> • ప్రస్తుతం చెరకు పంటలో పీక పురుగు ఆశించి నష్టపరిచేందుకు అనువుగా వుంది. నివారణగా పంట నీటి ఎద్దడికి గురి కాకుండా క్రమబద్ధమైన నీటి తడులు ఇవ్వాలి. మొవ్వ చనిపోయిన మొక్కలనుండి మొవ్వను పీకి తగులబెట్టాలి. లార్యాల నివారణకు క్లోరిపైరిఫాస్ 2.5 మీ.లీ. / లీ. నీటికి చొప్పున కలిపి పంటపై నాటిన 4, 6 మరియు 9 వారాలలో మొవ్వంతా బాగా తడిచేలా పిచికారీ చేసుకోవాలి.

ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా:

ఉద్యానవన విభాగం	ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా
మావిడి	<ul style="list-style-type: none"> • ప్రస్తుతం మామిడిలో పండు ఈగ ఆశించి నష్టపరిచేందుకు అవకాశం వుంది. నివారణగా ఫిరమోన్ ఎరలను ఎకరాకు 8-10 చొప్పున భిణ్ణామి నుంచి 3-6 అడుగుల ఎత్తులో అమర్చుకోవాలి.
టమోటా	<ul style="list-style-type: none"> • ప్రస్తుత పరిస్థితులలో టమోటా పంటలో సూది పురుగు ఆకు ముడుత కలుగజేయడమే కాక కాయల పై సూది మొన రంధ్రాలు చేసి నష్టాన్ని కలుగజేసే అవకాశం వుంది. దీని నివారణకు ఎకరాకు 8 లింగాకర్ణ బుట్టలు పెట్టాలి. క్వినాల్ఫాస్ 2 మీ.లీ. (లేక) ఎమమెక్సిన్ బెంజోయేట్ 0.3 గ్రా. (లేక) నోవల్యూరాన్ 1 మీ.లీ. / లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారీ చేసుకోవాలి.

ఇతరులు (మట్టి/భూమి తయారీ) ప్రత్యేక సలహా:

ఇతరులు (మట్టి/భూమి తయారీ)	ఇతరులు (మట్టి/భూమి తయారీ) ప్రత్యేక సలహా
భూమి తయారీ	<ul style="list-style-type: none"> • ప్రస్తుతం రైతులు లోతు దుక్కులు చేసుకొని ఖరీఫ్ కు నేలను సిద్ధం చేసుకోవాలి. దీని వలన పురుగుల గ్రుడ్లు, ప్యూపాలు మరియు ఇతర శిలీంధ్ర బీజాలు ఎండకు బయటపడి నశించి పోతాయి. అంతే కాకుండా కలుపు మొక్కల బెడద కొంత వరకు నివారించబడటమే కాక వర్షపు నీరు భూమిలోనికి ఇంకి నిల్వ వుండే అవకాశం వుంది.