



## గ్రామీణ వ్యవసాయ వాతావరణ సేవా పథకము

భారత వాతావరణ సంస్థ

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

లాం, గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్



# వ్యవసాయ వాతావరణ బులెటిన్

వాతావరణ సూచన : 07-06-2024

చిత్తూర్(ఆంధ్రప్రదేశ్) యొక్క వాతావరణ సూచన - జారీ చేయబడింది :2024-06-07 ( తదుపరి 5 రోజులలో 8:30 IST వరకు చెల్లుతుంది)

వాతావరణ కారకం	2024-06-08	2024-06-09	2024-06-10	2024-06-11	2024-06-12
వర్షపాతం (మి.మీ.)	10.0	6.0	1.0	2.0	1.0
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C)	33.8	34.2	34.6	33.8	33.8
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C)	24.2	24.4	24.6	24.2	23.8
గాలిలో తేమ శాతం-ఉ (%)	84	78	77	74	72
గాలిలో తేమ శాతం-సా (%)	82	73	72	74	72
గాలి వేగం (కి.మీ./గంటకు)	2	2	5	4	4
గాలి దిశ (డిగ్రీ)	250	270	230	270	250
మబ్బు ఆవరణ (ఆక్షా)	7	6	5	4	5

### వాతావరణ సూచనలు:

రాగల అయిదు రోజులలో ఆకాశం మేఘావృతమై వుండి తేలికపాటి జల్లుల కురిసే అవకాశం ఉంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33-34 డిగ్రీ సెం.గాను కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 23-25 డిగ్రీ సెం.గాను నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నది.

### సాధారణ సలహా:

వేరుశనగ విత్తుటకు ఇంకా సమయమున్నందున వర్షం కురిసి నేలలో తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే విత్తుకోవాలి.

### ఎస్.ఎం.ఎస్. సలహా:

వర్ష సూచన ఉన్నందున కళ్ళాల్లో ఉన్న ధాన్యాన్ని భద్రపరిచి పక్క దశలో ఉన్న పండ్ల కోతలు చేపట్టాలి.

### పంట ప్రత్యేక సలహా:

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వేరుశనగ	<ul style="list-style-type: none"> <li>జూన్ లో వర్షాధారంగా వేరుశనగ విత్తదలచుకున్న రైతులు నారాయణి, ధరణి, కె-9, ఐ.సి.జి.వి.-9114 వంటి రకాలను, కొంత నీటి వసతి ఉన్న చోట్ల గ్రీష్మ, కె-6, ధీరజ్, నిత్యహరిత వంటి రకాలను ఎన్నుకొని మాంకోజెబ్ 3 గ్రా./కేజి (లేక) టేబుకోనజోల్ 1 గ్రా./కేజి విత్తనానికి చొప్పున విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.</li> <li>జూన్ లో విత్తే రైతులు తప్పనిసరిగా చదరపు మీటరుకు 33 మొక్కలు పడేలా విత్తుకోవాలి.</li> <li>రక్షక పంటగా పొలం చుట్టూ 5-6 వరుసలలో జొన్న గాని సజ్జ గని విధిగా వేసుకోవాలి. దీనివలన వైరస్ తెగుళ్ళను వ్యాపింపజేసే కీటకాలను పంట మీదకు రాకుండా అరికట్టవచ్చు.</li> </ul>

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వరి	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుతం వరి నారు మడులు పోసుకొన్న రైతులు నారు పీకే వారం రోజుల ముందర కార్బోప్యూరాన్ 3జి గుళికలు సెంటుకు 160 గ్రాముల చొప్పున వెధజల్లుకోవాలి.</li> <li>• నారు మడులు గట్టిగ వున్నప్పుడు నారు తీత కష్టమై వేరు తెగే అవకాశం ఉన్నందున నారు పీకే వారం రోజుల ముందర సెంటుకు 4-6 కిలోల జిప్సొను వేసుకొని ఆ తరువాత నారు తీయాలి</li> </ul>

### ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా:

ఉద్యానవన విభాగం	ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా
మావిడి	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుతం మామిడిలో పండు ఈగ ఆశించి నష్టపరిచేందుకు అవకాశం వుంది. నివారణగా ఫిరమోన్ ఎరలను ఎకరాకు 8-10 చొప్పున భిణ్ణామి నుంచి 3-6 అడుగుల ఎత్తులో అమర్చుకోవాలి.</li> </ul>
టమోటా	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుత పరిస్థితులలో టమోటా పంటలో సూది పురుగు ఆకు ముడుత కలుగజేయడమే కాక కాయల పై సూది మొన రంధ్రాలు చేసి నష్టాన్ని కలుగజేసే అవకాశం వుంది. దీని నివారణకు ఎకరాకు 8 లింగాకర్ణ బుట్టలు పెట్టాలి. క్వినాలఫాస్ 2 మి.లీ. (లేక) ఎమమెక్సీన్ బెంజోయేట్ 0.3 గ్రా. (లేక) నోవల్యూరాన్ 1 మి.లీ. / లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>
వంకాయలు	<ul style="list-style-type: none"> <li>• వంగ, బెండ వంటి కూరగాయ పంటలలో కాయ తొలుచు పురుగు ఆశించి నష్ట పరిచే అవకాశం వుంది. నివారణకు క్లోరిపైరిఫాస్ 2 మి.లీ. / లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>

### ఇతరులు (మట్టి/భూమి తయారీ) ప్రత్యేక సలహా:

ఇతరులు (మట్టి/భూమి తయారీ)	ఇతరులు (మట్టి/భూమి తయారీ) ప్రత్యేక సలహా
భూమి తయారీ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుతం అక్కడక్కడ వర్ష సూచన ఉన్నందున లోతు దుక్కులు చేసేందుకు తగినంత తేమ ఉన్నట్లయితే రెండు మడకల రెక్క నాగలి□□పళ్ళ నాగలి ఉపయోగించి లోతు దుక్కులు చేసుకుని తదుపరి సబ్ సాయిలర్ తో ప్రతి 2 మీటర్లకు ఒక సాలు చేయడం వల్ల 45-60 సెం□లోతు వరకు భూమి లోపలి పోరా పెకిలించబడి వర్షాకాలంలో నీరు బాగా ఇంకి తేమ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.</li> </ul>