

## Custom Advisory At District Level of **Andhra Pradesh:11-06-2024**

### **DISTRICT-CHITTOOR**

**Weather Forecast of CHITTOOR District in Andhra Pradesh :-Issued On:2024-06-11 (Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)**

Date (yyyy-mm-dd)	Rainfall (mm)	Temp Max (°C)	Temp Min (°C)	Humidity I (%)	Humidity II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2024-06-12	1	36	24.8	74	68	10	250	6
2024-06-13	2	32.1	24.4	78	72	10	250	6
2024-06-14	2	34.4	23.6	81	70	10	250	6
2024-06-15	0	35.8	24.2	71	65	10	250	5
2024-06-16	0	35	25.2	72	63	10	250	5

#### **WEATHER SUMMARY ALERT**

రాగల అయిదు రోజులలో ఆకాశం మేఘావృతమై వుండి తేలికపాటి జల్లుల కురిసే అవకాశం ఉంది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 32-36 డిగ్రీ సెం.గాను కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 23-25 డిగ్రీ సెం.గాను నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నది.

#### **GENERAL ADVISORY**

వేరుశనగ విత్తుటకు ఇంకా సమయమున్నందున వర్షం కురిసి నేలలో తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే విత్తుకోవాలి.

#### **SMS ADVISORY**

నారుమడులు మరియు పిలకదశలో వున్నవరిలో ఆకుముడుత నివారణగా కార్బాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 2గ్రా/లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి

#### **Select category:**

#### **Select Type:**

#### **Select variety:**

- జూన్ లో వర్షాధారంగా వేరుశనగ విత్తదలచుకున్న రైతులు విశిష్ట, నారాయణి, ధరణి, కె-9, ఐ.సి.జి.వి.-9114 వంటి రకాలను, కొంత నీటి వసతి ఉన్న చోట్ల గ్రీప్సు, కె-6, ధీరజ్, నిత్యహరిత వంటి రకాలను ఎన్నుకొని మాకోజెబ్ 3 గ్రా./కేజి (లేక) టేబుకోనజోల్ 1 గ్రా./కేజి విత్తనానికి చొప్పన విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.
- జూన్ లో విత్తే రైతులు తప్పనిసరిగా చదరపు మీటరుకు 33 మొక్కలు పడేలా విత్తుకోవాలి.
- రక్షక పంటగా పొలం చుట్టూ 5-6 వరుసలలో జొన్న గాని సజ్జ గని విధిగా వేసుకోవాలి. దీనివలన వైరస్ తెగుళ్ళను వ్యాపింపజేసే కీటకాలను పంట మీదకు రాకుండా అరికట్టవచ్చు.

**CROP SPECIFIC ADVISORY****Select category: Rice****Select Type:**

- ప్రస్తుతం నారు మడులు పోస్తున్న రైతులు కిలో పొడి విత్తనానికి 3 గ్రా. (లేదా) లీటరు నీటికి 1 గ్రా. కార్బండిజెం కలిపిన ద్రావణంలో విత్తనాన్ని 24 గంటలు నానబెట్టి, 24 గంటలు మండే కట్టి మొలకెత్తిన విత్తనాన్ని నారు మడులలో చల్లుకోవాలి.
- ప్రస్తుతం నారుమడులు మరియు పిలక దశలో వున్న వరి పంటలో ఆకుముడుత మరియు కాండం తొలుచు పురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణగా కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 2 గ్రా. లీటరు నీటికి చొ.న. కలిపి పంట పై పిచికారి చేసుకోవాలి.

**Select category:****Select Type: Mango****Select variety:**

- ప్రస్తుతం మామిడిలో పండు ఈగ ఆశించి నష్టపరిచేందుకు అవకాశం వుంది. నివారణగా ఫిరమోస్ ఎరలను ఎకరాకు 8-10 చొప్పన భిక్షామి నుంచి 3-6 అడుగుల ఎత్తులో అమర్చుకోవాలి.

**Select category:****Select Type: Tomato****Select variety:**

- ప్రస్తుత పరిస్థితులలో టమోట పంటలో సూది పురుగు ఆకు ముడుత కలుగజేయడమే కాక కాయల పై సూది మొన రంధ్రాలు చేసి నష్టాన్ని కలుగజేసే అవకాశం వుంది. దీని నివారణకు ఎకరాకు 8 లింగాకర్ల బుట్టలు పెట్టాలి. క్వినాల్ఫాస్ 2 మి.లీ. (లేక) ఎమమెక్టిన్ బెంజోయేట్ 0.3 గ్రా. (లేక) నొవల్యూరాన్ 1 మి.లీ. / లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.

**Select category:****Select Type: Vegetables****Select variety:**

- వంగ, బెండ వంటి కూరగాయ పంటలలో కాయ తొలుచు పురుగు ఆశించి నష్ట పరిచే అవకాశం వుంది. నివారణకు క్లోరిపైరిఫాస్ 2 మి.లీ./ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.