



## గ్రామీణ వ్యవసాయ వాతావరణ సేవా పథకము

భారత వాతావరణ సంస్థ

ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

లాం, గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్



# వ్యవసాయ వాతావరణ బులెటిన్

వాతావరణ సూచన : 14-06-2024

చిత్తూర్(ఆంధ్రప్రదేశ్) యొక్క వాతావరణ సూచన - జారీ చేయబడింది :2024-06-14 ( తదుపరి 5 రోజులలో 8:30 IST వరకు చెల్లుతుంది)

వాతావరణ కారకం	2024-06-15	2024-06-16	2024-06-17	2024-06-18	2024-06-19
వర్షపాతం (మి.మీ.)	0.0	0.0	1.0	4.0	2.0
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C)	32.5	33.2	32.8	32.4	32.8
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత (°C)	24.7	25.0	24.5	24.3	25.0
గాలిలో తేమ శాతం-ఉ (%)	75	70	72	74	76
గాలిలో తేమ శాతం-సా (%)	58	54	56	60	62
గాలి వేగం (కి.మీ./గంటకు)	10	10	10	10	10
గాలి దిశ (డిగ్రీ)	250	240	240	240	240
మబ్బు ఆవరణ (ఆక్టా)	5	5	6	8	7

### వాతావరణ సూచనలు:

రాగల అయిదు రోజులలో ఆకాశం మేఘవృత్తమై వుండి తేలికపాటి జల్లుల కురిసే అవకాశం ఉంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 32-33 డిగ్రీ సెం.గాను కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 24-25 డిగ్రీ సెం.గాను నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నది.

### సాధారణ సలహా:

వేరుశనగ విత్తుటకు ఇంకా సమయమున్నందున వర్షం కురిసి నేలలో తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే విత్తుకోవాలి. లోతు దుక్కులు చేసి విత్తనాన్ని సిద్ధపరచుకోవాలి

### ఎస్.ఎం.ఎస్. సలహా:

నారుమడులు మరియు పిలకదశలో వున్నవరిలో ఆకుముడుత నివారణగా కార్బాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 2గ్రా.లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి

### పంట ప్రత్యేక సలహా:

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వేరుశనగ	<ul style="list-style-type: none"> <li>జూన్ లో వర్షాధారంగా వేరుశనగ విత్తదలచుకున్న రైతులు విశిష్ట, నారాయణి, ధరణి, కె-9, ఐ.సి.జి.వి.-9114 వంటి రకాలను, కొంత నీటి వసతి ఉన్న చోట్ల గ్రీన్, కె-6, ధీరజ్, నిత్యహరిత వంటి రకాలను ఎన్నుకొని మాంకోజెబ్ 3 గ్రా./కేజి (లేక) టేబుకోనజోల్ 1 గ్రా./కేజి విత్తనానికి చొప్పున విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.</li> <li>జూన్ లో విత్తే రైతులు తప్పనిసరిగా చదరపు మీటరుకు 33 మొక్కలు పడేలా విత్తుకోవాలి.</li> <li>రక్షక పంటగా పొలం చుట్టూ 5-6 వరుసలలో జొన్న గాని సజ్జ గని విధిగా వేసుకోవాలి. దీనివలన వైరస్ తెగుళ్ళను వ్యాపింపజేసే కీటకాలను పంట మీదకు రాకుండా అరికట్టవచ్చు.</li> </ul>

పంట	పంట ప్రత్యేక సలహా
వరి	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుతం నారు మడులు పోస్తున్న రైతులు కిలో పొడి విత్తనానికి 3 గ్రా. (లేదా) లీటరు నీటికి 1 గ్రా. కార్బండిజెం కలిపిన ద్రావణంలో విత్తనాన్ని 24 గంటలు నానబెట్టి, 24 గంటలు మండె కట్టి మొలకెత్తిన విత్తనాన్ని నారు మడులలో చల్లుకోవాలి.</li> <li>• ప్రస్తుతం నారుమడులు మరియు పిలక దశలో వున్న వరి పంటలో ఆకుముడుత మరియు కాండం తొలుచు పురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణగా కార్బాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 2 గ్రా. లీటరు నీటికి చొ.న. కలిపి పంట పై పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>

### ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా:

ఉద్యానవన విభాగం	ఉద్యానవన విభాగం ప్రత్యేక సలహా
మావిడి	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుతం మామిడిలో పండు ఈగ ఆశించి నష్టపరిచేందుకు అవకాశం వుంది. నివారణగా ఫిరమోన్ ఎరలను ఎకరాకు 8-10 చొప్పున భిణ్ణామి నుంచి 3-6 అడుగుల ఎత్తులో అమర్చుకోవాలి.</li> </ul>
టమోటా	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ప్రస్తుత పరిస్థితులలో టమోటా పంటలో సూది పురుగు ఆకు ముడుత కలుగజేయడమే కాక కాయల పై సూది మొన రంధ్రాలు చేసి నష్టాన్ని కలుగజేసే అవకాశం వుంది. దీని నివారణకు ఎకరాకు 8 లింగాకర్ణ బుట్టలు పెట్టాలి. క్వినాల్ఫాస్ 2 మి.లీ. (లేక) ఎమమెక్సిన్ బెంజోయేట్ 0.3 గ్రా. (లేక) నోవల్యూరాన్ 1 మి.లీ. / లీ. నీటికి చొ.న. పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>
వంకాయలు	<ul style="list-style-type: none"> <li>• వంగ, బెండ వంటి కూరగాయ పంటలలో కాయ తొలుచు పురుగు ఆశించి నష్ట పరిచే అవకాశం వుంది. నివారణకు క్లోరిపైరిఫాస్ 2 మి.లీ. / లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.</li> </ul>